Infección por *Staphylococcus aureus* *meticilino sensible*

Dra. Rosa Flieller

Dra. Graciela Pérez Sartori

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy

HISTORIA CLÍNICA 1

- SM, 62 años. F.I: 7/09/2014
- EA: Disnea progresiva CF III-IV y fiebre de hasta 39°C, de 3 semanas de evolución,
- AEA: Absceso en cuero cabelludo, de 1 mes de evolución de 8 cm, con supuración espontánea, levemente doloroso.
- EF: Desorientado, deshidratado. Palidez cutánea.
PP: 24 rpm. MAV disminuido globalmente. Estertores subcrepitantes en hemitórax derecho.
CV: RR 110 cpm. RBG, s/soplos.

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy

TC Tórax 9/9

Múltiples nódulos bilaterales, algunos cavitados, a predominio de hemitórax derecho que confluyen determinando consolidación parenquimatosa. Engrosamiento intersticial de ambos lóbulos superiores. Derrame pleural bilateral. Derrame pericárdico leve.

Globulos blancos	
Hemoglobina	10,8 g/dL
Leucocitos	23890/ mm ³
Azo/Crea	0,75/1,25 mg/dL
Glicemia	214 mg/dL
TP	58%
Hemocultivos X2 7/9 e hisopado de lesión 10/9	Desarrolla <i>Staphylococcus aureus</i> meticilino sensible (SAMS)

MICROBIOLOGÍA

Validado por: Asist. Dra. Noelia Batista

HEMOCULTIVO

TIPO DE MUESTRA	SANGRE
NUMERO DE TOMA:.....	TOMA 1 DE 2
HEMOCULTIVO:.....	DESARROLLA
TIPO DE MUESTRA	SANGRE
NUMERO DE TOMA:.....	TOMA 2 DE 2
HEMOCULTIVO:.....	DESARROLLA

Staphylococcus aureus

Antibiograma:

Antibiótico	Interpretación
-----	-----
Meticilina	SENSIBLE
Cefalotina	SENSIBLE
Trimetoprim/Sulfametoxazol	SENSIBLE
Clindamicina	SENSIBLE
Gentamicina	SENSIBLE

HISTORIA CLÍNICA 1

- En suma:
 - ✓ SM, 62 años.
 - ✓ Absceso de cuero cabelludo
 - ✓ Bacteriemia a SAMS
 - ✓ Neumonía necrotizante por SAMS con SIRS

Evolución

HISTORIA CLÍNICA 2

- SM, 63 años. F.I: 24/07/2014. AP: Diabético
- Ingresa por empuje de enfermedad desmielinizante primaria a nivel T8-T9 con mielitis transversa idiopática, diagnosticada en 6/14, cuando recibió bolos de metilprednisolona y corticoides v/o.
- Durante internación actual se realizó recambio plasmático (RTP).
- Múltiples accesos venosos con episodios de flebitis.
- 27/8 (30 d de internación) Tumorción infraclavicular izquierda, dolorosa, con elementos fluxivos y fiebre.

Glóbulos blancos	13.000/mm³
Linfocitos	1.470/mm ³
Neutrófilos	11.110/mm ³
Hb	8,7 g/dL
VES	120 mm/h
PCT	337 ng/mL
HC X 2	<i>Staphylococcus aureus</i> sensible a meticilina

HEMOCULTIVO

TIPO DE MUESTRA	SANGRE
NUMERO DE TOMA:.....	TOMA 1 DE 2
HEMOCULTIVO:.....	DESARROLLA
TIPO DE MUESTRA	SANGRE
NUMERO DE TOMA:.....	TOMA 2 DE 2
HEMOCULTIVO:.....	DESARROLLA

Staphylococcus aureus

Antibiograma:

Antibiótico	Interpretación
Meticilina	SENSIBLE
Cefalotina	SENSIBLE
Trimetoprim/Sulfametoxazol	SENSIBLE
Clindamicina	SENSIBLE
Gentamicina	SENSIBLE

TAC Tórax 6/9

Se observa colección líquida en hueco supraesternal, con realce periférico de apróx. 6x6x4 cm que se extiende a mediastino superior y pared anterior del tórax y hacia el espesor de los músculos pectorales izquierdos, donde presenta algunas burbujas de gas. Se relaciona con el lóbulo tiroideo izquierdo, con la tráquea, troncos supraaórtico y braquiocefálico izquierdo, con articulaciones esterno-claviculares.

HISTORIA CLÍNICA 2

- En suma:
 - ✓ SM, 63 años
 - ✓ Enfermedad desmielinizante primaria en empuje.
 - ✓ Bacteriemia a SAMS ¿Relacionada a catéter?
 - ✓ Absceso intratorácico

Limpieza quirúrgica

- Osteocondritis supurada de articulación esternoclavicular:
 - ✓ Resección 1^{er} cartílago costal, cartílago esternoclavicular, sector superior del esternón.
 - ✓ Se evacua contenido purulento del plano profundo del pectoral mayor.
 - ✓ Se deja drenaje multifenestrado por borde izquierdo del esternón

Hemos visto 2 casos de Bacteriemia a *Staphylococcus aureus* meticilino sensible complicadas con neumonía necrotizante uno y absceso de mediastino el otro

- Puntos a discutir:
 - ✓ Importancia y epidemiología
 - ✓ Evaluación y seguimiento
 - ✓ Tratamiento empírico
 - ✓ Tratamiento dirigido

Staphylococcus aureus

Mecanismos de patogenicidad

- Regulación positiva de **factores de virulencia** en medio desfavorable, permite la producción de bacteriemia y formación de focos secundarios.
- ✓ Adhesión y colonización: ej.: ác. teicoico.
- ✓ Invasión: toxinas exfoliativas, hemolisinas.
- ✓ Evasión: proteína inhibitoria de la quimiotaxis, leucotoxinas (toxina Panton-Valentine), expresión de superantígenos
- ✓ Formación de biopelículas
- ✓ Mecanismos de resistencia a antibióticos

Bacteriemia por *S. aureus*

Importancia y epidemiología

- Asociada a alta mortalidad y probabilidad de complicaciones: endocarditis infecciosa (EI), infecciones metastásicas.
- El por *S. aureus*: mortalidad mayor que la causada por otras especies bacterianas.
- Carga de enfermedad, estimada en 10,3 episodios/1000 egresos hospitalarios en EE.UU.
- En una serie de 724 pacientes con bacteriemia por *S. aureus*:
 - ✓ 246 pacientes (34%) infecciones metastásicas
 - ✓ 89 pacientes (12%) EI,
 - ✓ La tasa mortalidad a las 12 semanas fue 22% (157 pacientes)

Bacteriemia por *S. aureus*

Importancia y epidemiología

Datos de pacientes asistidos por enfermedades infecciosas en Hospital de Clínicas (1/2010-1/2013):

N: 384 pacientes.

HC+: 55 pacientes_ 14 *S.aureus* (28,57%)

	edad	Sexo	Staphylococcus	Síndromesclínicos1	síndromesclínicos2	Síndromesclínicos3	Síndromesclínicos4
1	21	masculino	SAMR.CO	Sinusitis	Otros síndromes SNC	-	-
2	27	masculino	SAMS	Artritis	Osteomielitis	Bacteriemia relacionada a catét	-
3	63	femenino	SAMR.CO	Absceso cerebras/Sub/epidural	Osteomielitis	-	-
4	61	femenino	SAMS	Bacteriemia relacionada a catét	-	-	-
5	28	masculino	SAMAR	Bacteriemia secundaria	Osteomielitis	-	-
6	52	femenino	SAMS	Endocarditis válvula protésica	-	-	-
7	64	femenino	SAMS	Osteomielitis	-	-	-
8	78	masculino	SAMS	Sepsis de origen no filiado	-	-	-
9	29	femenino	SAMS	Sepsis de origen no filiado	-	-	-
10	54	masculino	SAMS	Sepsis de origen no filiado	-	-	-
11	-	-	SAMS	Bacteriemia relacionada a catét	VIH/SIDA	-	-
12	25	masculino	SAMS	Bacteriemia primaria	Meningitis crónica	Otros síndromes pulmonares	VIH/SIDA
13	53	masculino	SAMAR	Bacteriemia relacionada a catét	ITU relacionada a catéter urin	VIH/SIDA	-
14	35	masculino	SAMS	Bacteriemia primaria	VIH/SIDA	Neumonía aguda	-

Evaluación

- Procedencia: comunitaria, vinculado a cuidados de la salud o intrahospitalaria.
- Evaluación del terreno:
 - ✓ Portador de válvulas protésicas, dispositivos endovasculares, prótesis, FAV, etc
 - ✓ Inmunosupresión.
- Valoración de posibles focos bacteriemia primaria o secundaria.
- Valoración de focos metastásicos

Seguimiento

Valoración temprana de posible bacteriemia complicada:

HC de control a las 48h

POSITIVO

Búsqueda de EI y focos metastásicos
(complicaciones no identificadas previamente):

ETT/ETE, TC, Centellograma

Factores de riesgo para bacteriemia complicada:

- ✓ Infección de origen comunitario
- ✓ Bacteriemia de brecha: hemocultivos positivos luego de 48-96 hs. de iniciado tratamiento antibiótico.
- ✓ Persistencia de fiebre luego de 72 hs. del comienzo de los síntomas
- ✓ Lesiones cutáneas sugestivas de infección sistémica

Bacteriemia no complicada

- Cumple todos los siguientes criterios
- ✓ Bacteriemia asociada a catéter con remoción del catéter
- ✓ Hemocultivos de control negativos
- ✓ Defervescencia de la fiebre en las primeras 72 hs
- ✓ ETE sin evidencia de endocarditis
- ✓ No material protésico
- ✓ No síntomas de infección metastásica

Puede plantearse tratamiento por 2 semanas

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy

Corey, GR. *Staphylococcus aureus* Bloodstream Infections: Definitions and Treatment. *CID* 2009; 48:254-9

Bacteriemia a *Staphylococcus aureus*

Tratamiento empírico

- ✓ Control de fuente: eliminación de catéteres infectados, drenaje de abscesos o intervención quirúrgica
- ✓ Antimicrobianos de amplio espectro, con dosis ajustadas a objetivos farmacodinámicos
- ✓ Decalar (si es posible) una vez identificado el patógeno implicado
- ✓ Sistema de control de infecciones que permita disminuir la propagación de resistencia a antimicrobianos y mejores resultados clínicos

McConeghy, KW., *et al.* The empirical combination of vancomycin and a β -Lactam for staphylococcal bacteremia. *CID* 2013;57:1760-65.

Bacteriemia a *Staphylococcus aureus*

Tratamiento empírico: ¿Por qué?

MAJOR ARTICLE

Outcomes Analysis of Delayed Antibiotic Treatment for Hospital-Acquired *Staphylococcus aureus* Bacteremia

Thomas P. Lodise,^a Peggy S. McKinnon, Linda Swiderski, and Michael J. Rybak

Anti-Infective Research Laboratory, Detroit Receiving Hospital and University Health Center, and Eugene Applebaum College of Pharmacy and Health Sciences, Wayne State University, Detroit, Michigan

- Estudio de cohorte retrospectivo.
- Retraso de 44.75 horas en el tratamiento se asoció con un aumento de 4 veces en la probabilidad de muerte relacionada a infección (odds ratio [OR] = 3,8; de confianza del 95% [IC], 1,3 a 11,0)

Lodise T.P., et al. Outcomes analysis of delayed antibiotic treatment for hospital-acquired *Staphylococcus aureus* Bacteremia. CID 2003; 36:1418–23

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy

Bacteriemia a *Staphylococcus aureus* Tratamiento empírico: ¿Con qué?

J Antimicrob Chemother
doi:10.1093/jac/dkq373

**Journal of
Antimicrobial
Chemotherapy**

Importance of appropriate empirical antibiotic therapy for methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* bacteraemia

Mical Paul^{1,2*}, Galia Kariv^{2,3}, Elad Goldberg^{1,2}, Maria Raskin¹, Hila Shaked¹, Rawi Hazzan¹, Zmira Samra^{2,4},
Dina Paghis^{2,4}, Jihad Bishara^{1,2} and Leonard Leibovici^{2,3}

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy

Paul M., et al. Importance of appropriate empirical antibiotic therapy for methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* bacteraemia. *J AC* 2010;65: 2658-65.

Bacteriemia a SAMR

Tratamiento empírico: ¿Con qué?

Paul et al

Metaanálisis de 9 estudios: La probabilidad de mortalidad por infección se duplica con terapia empírica inadecuada para SAMR

Figure 1. Review: compilation of studies assessing the effects of inappropriate empirical antibiotic treatment for invasive MRSA infections (mainly bacteraemia). Log ORs with standard error (SE) were used to calculate ORs with 95% CIs, which were pooled using a random effects model. ORs >1 indicate higher mortality with inappropriate empirical antibiotic treatment. Studies are subgrouped by performance of multivariable analysis and the event/covariate ratio in this analysis.

Vancomicina 15-20 mg/Kg/dosis c/12 hs (dosis carga 30 mg/Kg a pasar en 2 hs)

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

Paul, M., et al. Importance of appropriate empirical antibiotic therapy for methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteraemia. *JAC* 2010;65: 2658-65.

www.infectologia.edu.uy

Bacteriemia a SAMS

Tratamiento empírico: ¿Con qué?

- La bacteriemia a SAMS debe ser tratada con una penicilina anti-estafilocócica o una cefalosporina de primera generación
- Varios estudios de cohortes reportan pobres resultados clínicos utilizando vancomicina en el tratamiento de bacteriemias por SAMS
- En EI por SAMS se ha demostrado mayor riesgo de muerte por infección en pacientes que iniciaron tratamiento con vancomicina con cambio posterior a betalactámicos

McConeghy, KW., et al. The empirical combination of vancomycin and a β -Lactam for staphylococcal bacteremia. *CID* 2013;57:1760-65.

Bacteriemia a SAMS

Tratamiento empírico: ¿Con qué?

Table 1. Summary of Published Studies Evaluating Empirical Therapy for Methicillin-Susceptible *Staphylococcus aureus* Bacteremia

Study	Year	Design	Study Size, No.	Outcome	Vancomycin vs β -Lactam	Result ^a
Vancomycin therapy vs β-lactam therapy^b						
Chang et al [19]	2003	Prospective cohort	505	Bacteriologic failure ^c	19% vs 0%	OR, 6.5 (1.0–53)
Khatib et al [20]	2006	Prospective cohort	120	Overall mortality	27% vs 12%	HR, 2.3 (1.1–4.9)
Stryjewski et al [21] ^d	2007	Prospective cohort	123	Treatment failure	31% vs 13%	OR, 3.5 (1.2–13)
Lodise et al [6] ^e	2007	Retrospective cohort	84	Infection-related mortality	39% vs 11%	OR, 6.5 (1.4–29)
Kim et al [22]	2008	Retrospective case-control	27	Infection-related mortality	37% vs 11%	OR, 3.3 (1.2–9.5)
Schweizer et al [23]	2011	Retrospective	267	30-day in-hospital mortality	20% vs 3%	HR, 4.8 (2.1–11) ^f
Chan et al [24]	2012	Retrospective cohort	293 094	Hospitalization rate	12.5 vs 7.2 ^g	HR, 1.6 (1.2–2.2) ^f
Vancomycin therapy vs vancomycin therapy de-escalated to β-lactam						
Lodise et al [6] ^e	2007	Retrospective cohort	84	Infection-related mortality	33% vs 41%	NS
Schweizer et al [23]	2011	Retrospective cohort	267	30-day in-hospital mortality	20% vs 7%	HR, 3.2 (1–10)
Vancomycin therapy de-escalated to β-lactam therapy vs β-lactam therapy						
Khatib et al [25]	2006	Prospective cohort	168	Persistent bacteremia	56% vs 37%	$P = .03$
Lodise et al [6] ^e	2007	Retrospective cohort	84	Infection-related mortality	41% vs 11%	Not reported

McConeghy, KW., et al. The empirical combination of vancomycin and a β -Lactam for staphylococcal bacteremia. *CID* 2013;57:1760-65.

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy

Tratamiento empírico combinado

Vancomicina + nafcilina o cefazolina

- Posibilidad de tratamiento empírico para pacientes graves
- La posibilidad de toxicidad debe valorarse en relación a la gravedad del paciente. Considerando que no debería prolongarse más allá de las 72 hs.
- Los métodos de detección molecular acortan el tiempo de identificación de 49 hs a 5,5 hs y así la ventana de tratamiento empírico

- La experiencia clínica con el empleo de penicilinas anti-estafilocócicas y cefazolina indica que ambas son superiores a vancomicina en el tratamiento de la bacteriemia por SAMS.

Outcome of Vancomycin Treatment in Patients with Methicillin-Susceptible *Staphylococcus aureus* Bacteremia[∇]

Sung-Han Kim,^{1,3} Kye-Hyung Kim,¹ Hong-Bin Kim,¹ Nam-Joong Kim,¹ Eui-Chong Kim,^{2,3}
Myoung-don Oh,^{1,3*} and Kang-Won Choe^{1,3}

- Estudio de cohorte retrospectivo: 294 pacientes con bacteriemia a SAMS.(B SAMS)
- Estudio de casos y controles:
 - ✓ B SAMS que recibieron vancomicina: 37% mortalidad (10/27)
 - ✓ B SAMS que recibieron betalactámicos: 11% mortalidad (6/54) (P<0,01)

Characteristic	Vancomycin treatment (n = 27) ^a	Beta-lactam treatment (n = 267) ^a	P value
Age (yr, mean ± SD)	52.1 ± 18.4	56.0 ± 17.4	0.26
Male gender	16 (59)	164 (61)	0.83
Community-acquired infection	12 (44)	147 (55)	0.29
Length of hospital stay before SAB			
<72 h	12 (44)	147 (55)	0.29
3–7 days	3 (11)	32 (12)	0.89
8–28 days	8 (30)	65 (24)	0.47
>28 days	4 (15)	23 (9)	0.29

McCabe classification

Overall deaths	11 (41)	65 (24)	0.06
30-day deaths	9 (33)	49 (18)	0.06
14-day deaths	9 (33)	40 (15)	0.03
SAB-related deaths	10 (37)	47 (18)	0.02
Deaths not related to SAB	1 (4)	20 (8)	0.71

Eradicated foci of infection	8 (30)	94 (35)	0.56
Neutropenia	8 (30)	40 (15)	0.06
Infection acquired in intensive care unit	5 (19)	17 (6)	0.04
Previous admission history	10 (37)	86 (32)	0.61
Previous antibiotic use	15 (56)	71 (27)	0.002
Previous surgery	3 (11)	23 (9)	0.72
Defervescence (days, mean ± SD)	5.0 ± 6.2	3.5 ± 2.8	0.08
Duration of treatment ^c (days, mean ± SD)	20.2 ± 12.4	21.9 ± 13.9	0.63
Combination treatment	0 (0)	11 (4)	0.61
Metastatic infection	8 (30)	50 (18)	0.18
Infective endocarditis	4 (15)	9 (3)	0.02
Overall deaths	11 (41)	65 (24)	0.06
30-day deaths	9 (33)	49 (18)	0.06
14-day deaths	9 (33)	40 (15)	0.03
SAB-related deaths	10 (37)	47 (18)	0.02
Deaths not related to SAB	1 (4)	20 (8)	0.71
Recurrence	0 (0)	7 (3)	0.39
Cure	16 (59)	200 (75)	0.08

^a Data are presented as the number (%) of patients unless indicated otherwise.

^b Catheter was removed in 60 (92%) of 65 patients with catheter-related infection.

^c A total of 218 patients, excluding 76 patients who died, were included in this analysis.

Staphylococcus aureus Bacteremia

Recurrence and the Impact of Antibiotic Treatment in a Prospective Multicenter Study

Feng-Yee Chang, James E. Peacock, Jr., Daniel M. Musher, Patricia Triplett, Brent B. MacDonald, Joseph M. Mylotte, Alice O'Donnell, Marilyn M. Wagener, and Victor L. Yu

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy

Bacteriemia a SAMS tratamiento dirigido Betalactámicos

- **Tratamiento de elección**
 - ✓ Actividad SAMS: Carbapenemens > **penicilinas isoxazólicas** (oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina) > penicilina/inh. penicilinasas > **cefalosporinas**
 - ✓ En infección grave, del SNC, neutropénicos o con elevada carga bacteriana es aconsejable mantener concentración sérica 4-5 por encima de la CIM

Mensa et al. Guía de tratamiento antimicrobiano de la infección por *Staphylococcus aureus*. Rev Esp Quimioter 2013; 26 (Supl. 1):1-84

Cefalosporinas

- Actividad frente a SAMS:
 - ✓ Cefazolina, cefuroxima con CMI_{90} de 2 mg/L
 - ✓ Cefotaxima, ceftriaxona y cefepima CMI_{90} 4 mg/L
 - ✓ Cefoxitina y cefonicid CMI_{90} 8 mg/L
 - ✓ Ceftazidima CMI_{90} 16 mg/L

Efecto inóculo

- La actividad de los betalactámicos disminuye en presencia de un inóculo de *S. aureus* elevado porque aumenta la concentración local de betalactamasas.
- La importancia del efecto inóculo es proporcional a la sensibilidad a la hidrólisis por las betalactamasas.
- Si el inóculo es elevado, la CMI de cefazolina puede aumentar más de 32 veces.
- Resistencia a hidrólisis por betalactamasas en orden decreciente:

Meticilina=nafcilina

Cloxacilina

Cefuroxime

Ceftriaxona

Cefalotina

Cefalexina

Cefazolina

Microb Drug Resist. 2014 Jul 7. [Epub ahead of print] Clinical Implications of Cefazolin Inoculum Effect and β -Lactamase Type on Methicillin-Susceptible *Staphylococcus aureus* Bacteremia.

- **Background:** SAMS productor de β -lactamasas A o C muestran efecto inóculo con Cefazolina
- Implicancia de E. inóculo oscura.
- **Método:** Estudio retrospectivo de bacteriemia SAMS tratados con cefazolina. Se identificó tipo de β -lactamasa

- **Resultados**
- 113 aislamientos, 57.5% CIE
- Bacteriemia persistente más frec en CIE (9% vs. 0%, $p=0.04$)
- En Multivariado Enf CV, NA, osteoarticular, endocarditis fueron predictores de fallo terapéutico. CIE NO se asoció a fallo terapéutico
- **Conclusiones:** CIE puede asociarse a bacteriemia persistente si cefazolina se usa para alta carga de infección. PERO los sitios de infección son más importantes

Considerar la terapia combinada

- ✓ Alta carga bacteriana o la infección cursa con criterios de sepsis grave (dosis óptimas desde el inicio)
- ✓ SAMS con CIM de vancomicina >1 mg/L: asociaciones con potencial sinergia cloxa+dapto/fosfomicina/aminoglucósido
- ✓ Formación de biopelículas (material protésico). Ej.: levofloxacin + rifampicina, en prótesis osteoarticulares
- ✓ Cepas productoras de toxinas como leucocidina de Panton-Valentine o hemolisinas. Ej.: Linezolid o Clindamicina en neumonía.
- ✓ Localizadas en áreas poco accesibles al betalactámico administrado por vía sistémica (globo ocular, SNC y las colecciones supuradas que no pueden drenarse de inmediato o el drenaje es incompleto).

Sinergia

- **In vitro**: daptomicina, fosfomicina o aminoglucósido
- **Aminoglucósidos**:
 - ✓ Presentan cierta actividad sobre bacterias intracelulares.
 - ✓ Asociación recomendada para el tratamiento de EI.
 - ✓ La evidencia clínica de sinergia en EI a SAMS es marginal
- **Quinolonas**: En general la asociación es indiferente.
 - ✓ Presentan buena penetración alveolar, en LCR y citoplasmática (levofloxacin)

Mensa *et al.* Guía de tratamiento antimicrobiano de la infección por *Staphylococcus aureus*. *Rev Esp Quimioter* 2013; 26 (Supl. 1):1-84

SAMS

SAMR

Bacteriemia primaria o asociada a infección del catéter vascular	Cloxacilina	Daptomicina Vancomicina Linezolid Teicoplanina	<p>- Si los hemocultivos se negativizan en las primeras 24-48 horas de tratamiento, después de la fase inicial de terapia por vía iv, el paciente afebril, estable y sin evidencia clínica de metástasis puede completar el tratamiento por vía oral. En caso de infección producida por SAMS puede emplearse amoxicilina-clavulánico, clindamicina, o minociclina en monoterapia o una fluoroquinolona (levofloxacin o moxifloxacin) asociada a rifampicina. En caso de infección por SAMR puede emplearse linezolid, cotrimoxazol o minociclina.</p> <p>- En la bacteriemia persistente (>5-7 días) o recidivante, sin foco endovascular aparente⁵, asociar un segundo antibiótico anti-estafilocócico con o sin rifampicina. Si el paciente estaba recibiendo tratamiento con cloxacilina añadir daptomicina ± rifampicina. Si recibía daptomicina añadir linezolid, fosfomicina o cloxacilina ± rifampicina. Si recibía vancomicina sustituirla por daptomicina + cloxacilina + rifampicina.</p>
--	-------------	---	--

Localización	Tratamiento		Comentarios ²
	SASM ¹	SARM	
Endocarditis ⁴⁵ Válvula nativa	Cloxacilina ± gentamicina ⁷ (3-5 días)	Daptomicina + fosfomicina y/o gentamicina (3-5 días) Vancomicina	<ul style="list-style-type: none"> - En caso de infección por SASM, si el filtrado glomerular es menor de 40 mL/min o el paciente recibe otra medicación potencialmente nefrotóxica evitar el empleo de gentamicina o sustituirla por daptomicina⁷. - En la infección por SASM con CMI de vancomicina > 1 mg/L, criterios de sepsis grave o bacteriemia >5-7 días, considerar la adición de daptomicina. - En caso de infección por SARM la adición a daptomicina de fosfomicina y/o gentamicina depende de la sensibilidad de la cepa y del riesgo de toxicidad renal. Si la cepa es resistente a fosfomicina (CMI>32 mg/L) considerar la sustitución por cloxacilina o cotrimoxazol. - La pauta con vancomicina solo debe considerarse si la CMI es <1 mg/L. En caso de que la CMI sea ≥1 mg/L, antes de utilizar vancomicina es necesario descartar la existencia de heteroresistencia, tolerancia o efecto inóculo.
Válvula protésica	Cloxacilina + gentamicina ⁷ (15d) + rifampicina	Daptomicina + rifampicina + fosfomicina y/o gentamicina Vancomicina + gentamicina (15d) + rifampicina	<ul style="list-style-type: none"> - En caso de infección por SASM, si el filtrado glomerular es menor de 40 mL/min o el paciente recibe otra medicación potencialmente nefrotóxica considerar la sustitución de gentamicina por daptomicina⁷ o por una quinolona (si la cepa es sensible). Iniciar el tratamiento con rifampicina a partir del 3º-5º día. - En la infección por SASM con CIM de vancomicina > 1 mg/L, criterios de sepsis grave o bacteriemia > 5-7 días, considerar la adición de daptomicina. - En la infección por SARM asociar fosfomicina y/o gentamicina según la sensibilidad de la cepa y el riesgo de toxicidad renal. Si la cepa es resistente a fosfomicina (CMI>32 mg/L) considerar la sustitución por cloxacilina o cotrimoxazol. - La pauta que contiene vancomicina solo debe considerarse si la CMI de ésta es <1 mg/L. En caso de que la CMI sea ≥1 mg/L antes de utilizar vancomicina es necesario descartar la existencia de heteroresistencia, tolerancia o efecto inóculo.

Tabla 1

Antimicrobianos recomendados para el tratamiento de la infección estafilocócica según localización del foco y sensibilidad de la cepa a meticilina

Localización	Tratamiento		Comentarios ²
	SASM ¹	SARM	
Neumonía	Cloxacilina	Linezolid Vancomicina ± rifampicina	- En caso de infección por una cepa productora de PVL, el tratamiento debe incluir linezolid o clindamicina. - Si la infección por SARM cursa con bacteriemia considerar la asociación de linezolid con daptomicina.

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy

Mensa *et al.* Guía de tratamiento antimicrobiano de la infección por *Staphylococcus aureus*. *Rev Esp Quimioter* 2013; 26 (Supl. 1):1-84

HISTORIA CLÍNICA 1

CONCLUSIONES

- Tratamiento de 1ª línea:

Cloxacilina ± daptomicina

o

Cloxacilina + Clindamicina o Linezolid

- No contamos con Cloxacilina planteamos (2ª línea)

Cefazolina o Ceftriaxona + Levofloxacinina o Linezolid
(penetración a pulmón y actividad con inóculo alto)

HISTORIA CLÍNICA 2

CONCLUSIONES

- Idealmente Cloxacilina $\pm$ TMP-SMX, levofloxacinina, fosfomicina, etc
- Alternativo Cefazolina $\pm$ TMP-SMX, levofloxacinina, etc

HISTORIA CLÍNICA 2

CONCLUSIONES

- Idealmente Cloxacilina $\pm$ gentamicina
- Alternativa: Cefazolina $\pm$ gentamicina

FUNDAMENTAL DRENAR ABSCESO CON CELERIDAD

Conclusiones

- Patógeno con múltiples factores de virulencia, entre ellos, capacidad metastásica.
- Frente a un paciente con bacteriemia por *S. aureus* siempre descartar complicaciones:

Buscar bacteriemia de brecha y metástasis a distancia

Conclusiones

- Es pilar fundamental del tratamiento de las infecciones por *S. aureus* reducir la carga bacteriana:
drenaje, debridamiento o retirada del material extraño
- Los betalactámicos son los fármacos de primera línea en el tratamiento de SAMS
- Considerar mono o biterapia según localización
- En bacteriemias a SAMS el uso de vancomicina se asocia a peores resultados clínicos

Cátedra de Enfermedades Infecciosas

Cátedra de
Enfermedades Infecciosas

www.infectologia.edu.uy