

ALGORITMO CASO SINTOMÁTICO – INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA SIN ELEMENTOS DE GRAVEDAD

INFECCIÓN RESPIRATORIA CON O SIN FIEBRE

Síntomas y signos de enfermedad respiratoria aguda alta (±conjuntivitis) y/o baja ± anosmia/ageusia ± síntomas digestivos

Muestra para biología molecular para SARS-CoV-2*



NEGATIVO:

Si persiste sospecha clínica priorizar repetir test por biología molecular en personal de salud, embarazadas >36 semanas, situaciones puntuales de alto riesgo de transmisión o persistencia de fiebre y síntomas por más de 7 días.⁽⁵⁾

POSITIVO

*PRIORIZAR:

- Inmunodeprimidos⁽¹⁾
- Personal de salud y otro personal esencial⁽²⁾
- Edad >60años
- Comorbilidades⁽³⁾
- Embarazada
- Personas institucionalizadas
- Otros⁽⁴⁾



**En personal de salud:

Levantar aislamiento luego de:

- 72 hs en apirexia y mejoría de síntomas (persistencia de algunos síntomas no implica transmisión ej. tos, anosmia, disgeusia)
- Al menos 10 días desde inicio de síntomas

No requiere realización de test por biología molecular para levantar aislamiento.

En caso de inmunosuprimidos mantener aislamiento al menos 14 días del inicio de los síntomas.

Al reintegro mantiene recomendación de uso de mascarillas en personal de salud.

NEGATIVO

POSITIVO



COVID-19 CONFIRMADO



Se descarta COVID-19
Manejo habitual de IRA

CRITERIOS DE RETIRO DE AISLAMIENTO:**

10 días desde inicio de los síntomas + al menos 72hs sin fiebre y mejoría de los síntomas.
Posteriormente mantener medidas de distanciamiento social e higiene respiratoria como población general.

⁽¹⁾ **Inmunodeprimidos:** trasplante, inmunosupresión farmacológica o primaria, VIH con < 350 CD4, cáncer en tratamiento actual o reciente.

⁽²⁾ **Personal de salud:** incluye personal de atención de centros de cuidados de alta permanencia (hogares de ancianos, residenciales, clínicas psiquiátricas, centros de rehabilitación); servicios privados de acompañantes.

Personal esencial: Policías, militares y bomberos.

⁽³⁾ **Comorbilidades:** enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, enfermedad renal crónica avanzada, obesidad. Priorizar suma de comorbilidades.

⁽⁴⁾ Priorización secundaria de test a aquellos que sean **convivientes de personas con comorbilidades o inmunodepresión.**

⁽⁵⁾ Valorar uso de test de anticuerpos luego del séptimo día.

